

Số: /SNN-TTBVTV
V/v khôi phục sản xuất
sau đợt mưa lũ bất thường

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh từ ngày 31/3 đến ngày 02/4/2022, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to liên tục và gió mạnh đã ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt, nhiều diện tích lúa giai đoạn ngâm sữa đến chín, hoa màu bị đổ ngã, ngập úng. Dự báo trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa. Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Cục Trồng trọt theo công văn số 295/TT- CLT ngày 04/4/2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương triển khai một số biện pháp như sau:

1. Đối với cây lúa

Khẩn trương tập trung lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch đối với diện tích lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, sau khi thu hoạch cần phơi hoặc sấy cho khô kịp thời để hạn chế nảy mầm.

Đối với diện tích bị ngập úng: Khẩn trương huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, tiêu nước trong ruộng lúa, không để ruộng lúa bị ngâm nước nhiều ngày, nhằm hạn chế lúa bị mọc mầm và các nấm gây bệnh như khô vằn, lem lép hạt phát sinh gây hại nặng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo.

2. Đối với cây rau màu

Đối với diện tích cây màu như ngô, lạc, khoai lang,... sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng để cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần xới xáo phá váng, vun gốc kịp thời, tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, NPK,...

Đối với diện tích rau đậu các loại đã trồng như các loại bí, ớt, dưa, đậu các loại cần khơi thông mương rãnh, tháo khô nước. Nếu bị ngập, sau khi nước rút 2 - 3 ngày cần hướng dẫn nông dân chăm sóc để phục hồi bộ rễ và hạn chế thấp nhất các bệnh héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ.

Đối với diện tích rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch nhanh để giảm thiểu thiệt hại do ngập úng.

3. Đối với cây ăn quả

Đối với vườn cây đang ngập úng cần tiến hành đào rãnh ngay, khơi thông dòng chảy để rút nhanh nước ra khỏi vườn cây.

Đối với những vườn đã rút nước cần tập trung xới nhẹ, phá váng lớp đất mặt (vùng tán cây) giúp đất thông thoáng, khắc phục tổn thương và tái sinh rễ mới; riêng cây hồ tiêu chỉ tiến hành phá váng khi đất tương đối khô để tránh lây lan bệnh chết nhanh và chết chậm, tiến hành rong tĩa cây che bóng, tránh việc để cây che bóng quá rậm rạp trong mùa mưa.

Đối với những vườn cây đang đậu quả non hoặc quả trong giai đoạn phát triển: Phun phân bón lá có chứa Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn,... để tránh hiện tượng nứt, rụng quả.

Thường xuyên theo dõi vườn cây, kịp thời cắt tỉa cành gãy đổ, đặc biệt là cây bị long gốc, phát hiện kịp thời bệnh thối rễ do nấm gây ra và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Cây bị long gốc cần dặm chặt, vun gốc, sau đó có thể tưới thuốc trừ nấm hoặc các chế phẩm sinh học đối kháng nấm hại bằng loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng, nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi bộ rễ cây đã phục hồi, mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng, phân bón lá (hạn chế sử dụng phân bón hóa học) để tăng khả năng phục hồi của cây.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương triển khai thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng do mưa lũ gây ra đối với sản xuất trồng trọt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NVTH;
- Lưu: VT, TTBVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Bá Ninh